



TEST SYNACTHENE BLOC (Protocole : Dr SMAGALA)

Date prévue du test : __/__/__
Date effective du test : __/__/__

Heure du premier prélèvement : __ h __

Préleveur :

Prescripteur :

Coller une étiquette patient

Indication :

Déficits enzymatiques cortico-surrénaux (hyperplasie congénitale des surrénales), bilans d'hirsutisme.

Précautions particulières :

Chez la femme, test à réaliser dans les premiers jours d'un cycle menstruel

Injection IM (ou IV uniquement si anticoagulation ou si contre-indication à l'injection IM)

Matériel :

- Produit administré : 1 ampoule de 250µg de **SYNACTHENE IMMEDIAT** (0,25 mg)
- 4 tubes **secs** (bouchon jaune) + 1 tube **EDTA** (bouchon mauve) + 1 pain de glace

Déroulement du test + examens à réaliser

	T 0	T 60 min
ACTH	X	
Cortisol	X	X
17 OH progestérone	X	X
S-DHA	X	
DHA	X	
Delta-4-androstenedione	X	
Testostérone totale	X	
11 désoxycortisol	X	X
21 désoxycortisol	X	X

Tubes à prélever	1 EDTA (bouchon mauve) sur glace 2 secs (bouchon jaune)	2 secs (bouchon jaune)
Produit à administrer	Injection d'1 ampoule de 250µg de SYNACTHENE IMMEDIAT	

Sur chaque tube, **noter impérativement le temps du test correspondant.**

Dès la fin du test, acheminer l'intégralité des prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »)

Saisie au laboratoire :

Test IV endocrino 2 tps (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques », rubrique « Test au synacthène ») ou **code panel SYNIV.**

Mettre l'heure du premier prélèvement indiquée par le service en heure de prélèvement du dossier.